

CARCINOME CANALAIRE IN SITU ROLE DU PATHOLOGISTE

F Le Marc'hadour- L Siché- F Gasnier

Juin 2011

MODE DE DECOUVERTE

MACROBIOPSIES/CALCIFICATIONS ++++

PIECES OPERATOIRES

- HCA +
- PAPILLOME > 10 MM
- CICATRICE RADIAIRE

MACROBIOPSIES/NODULE

DU 01-01-2010 AU 31-03-2011

402 PROCEDURES MAMMOTOME

2 A 27 BIOPSIES/CAS

MOYENNE 8 BIOPSIES/CAS

ADRESSEES AVEC RADIOS DES BIOPSIES

28 A 83 ANS

MOYENNE 54 ANS

CÔTE

NON PRECISE: 3

DROIT: 194

GAUCHE: 205

EXAMEN HISTOLOGIQUE EN DOUBLE LECTURE

RESULTATS (1) : BENIN= 221 CAS (55%)

Mastose-Papillome-Cic.Rad. = 191 CAS (47,5%)

Cicatrice- Stéatonécrose-Normal = 11 CAS (2,7%)

Fibro-adénome =19 CAS (4,7%)

RESULTATS (2): MALIN = 151 CAS (37,5%)

CCIS = 121 CAS (30%)

LIN 3 = 6 CAS(1,5%)

CCI + CCIS = 20 CAS (5%)

CLI + LIN 3 = 4 CAS (1%)

RESULTATS (3): HYPERPLASIE CANALAIRE

ATYPIQUE = 30 CAS (7,5%)

NB: PAS DE CALCIFICATION SUR COUPES
HISTOLOGIQUES: 8 CAS (2%)

→ REPERAGE SUR RADIO DE BIOPSIES DE LA/LES
BIOPSIES INCRIMINEES

→ COUPE DU BLOC CONCERNE JUSQU'À
EPUISEMENT

	Bénin	CCIS	Infiltrant	LIN 3	HCA
Travade 633 cas	61,1%	18,5%	9%	1,6%	9,8%
Penco 4047 cas	65,9%	22,5%	6,9%	2,2%	2,5%
Tourasse 1400 cas	64,6%	19,7%	6,9%	1,3%	7,5%
Bouté 212 cas	64,2%	19,8%	5,7%	2,8%	7,5%
Etude présente	55%	30%	6%	1,5%	7,5%

SUIVI DES CCIS: 77/121

PAS DE RELIQUAT: 15 CAS (19,5%)

CCIS RESIDUEL: 50 CAS (64,9%)

CCI: 11 CAS (14,3%)

LIN 3: 1 CAS (1,3%)

SOUS EVALUATION DES CCIS/BIOPSIES

Penco (800 cas): 17,9%

Tourasse (85 cas): 5,8%

Bouté (45 cas): 27%

Lourenco (166 cas): 27,1%

Etude présente (77 cas): 14,3%

CRITERES PREDICTIFS DE SOUS EVALUATION

Penco (17,9%). Exérèse partielle: 23%; Exérèse complète: 5,6%

Etude présente (14,3%). CCIS haut grade: 20,6%;
CCIS non haut grade: 9,3%

100 MAMMOTOMES/MICROCALCIFICATIONS

