


Cas 1

- Patient âgé de 46 ans
- Pas d'antécédent
- Douleur de la région inguinale droite
- Fièvre
- Syndrome inflammatoire








Hernie de AMYAND

- **Appendic(ite)s ectopiques**
- **Hernies pariétales abdominales antérieures**

Appendices ectopiques

➤ *Caecum en place*

- orthotopique
- rétrocolique
- mais aussi (long)
 - . mésocoeliaque
 - . pelvien
 - . sous-hépatique
 - . paroi abdo



Appendices ectopiques


➤ *Caecum en place*




défaut d'accolement
du fascia de Toldt droit



➤ *Caecum non en place*



malrotation de



l'anse intestinale primitive











Hernie de AMYAND



- appendice dans une hernie inguinale oblique externe
appendice normal ou inflammatoire
- très rare probablement moins de 1 % chez l'adulte
- le diagnostic clinique peut être difficile chez le très jeune enfant :
diagnostic souvent en per-opératoire (1 à 2 mois , incarceration)
- imagerie (echo et surtout TDM chez l'adulte) :diagnostic du siège de
l'appendice et d'une éventuelle inflammation
- complication : phlegmon ou abcès de la région inguinale en particulier
chez le sujet âgé
- conséquences sur la prise en charge chirurgicale :
 - traitement de la hernie avec prothèse pariétale en l'absence de
complication infectieuse
 - traitement de l'appendicite aiguë avec cure de la hernie
dans un 2^e temps

Autres hernies éponymes de la paroi abdominale antérieure

Hernie de Garangeot



appendice , inflammatoire ou non dans une hernie fémorale(crurale)

Hernie de Littre

toute hernie pariétale antérieure renfermant un diverticule de Meckel, compliqué ou non

Hernie de Spieghel

le long de la ligne semi-lunaire de Spieghel à la limite entre l'aponévrose antérieure du muscle transverse et le bord externe du muscle grand droit.



H de Spiegelhel

H Obl Ext

H Obl Int

H Fémorale




H Oblique Externe -indirecte

H Oblique Interne - directe

H Fémorale (crurale)

Delabrousse E et coll
Valeur de l'épine du pubis
comme repère TDM des
hernies de l'aîne
J Radiol 2005



Pour en savoir plus

- Les hernies éponymes de l'abdomen
Regent D, Tissier S, Barbary B , Corby S, Kermarrec E, Laurent V
Poster électronique Paris JFR 2006
- Appendicite
Mathias J, Bruot O, Ganne PA, Laurent V, Régent D
EMC Radiodiagnostic – Appareil digestif, 33-472-G-10, 2008
- Imagerie des appendicites ectopiques
Ottenin MA, Balaj C, Fairise a, Gervaise A, H. Ropion-Michaux H, Laurent V, Régent D
Poster électronique Paris JFR 2011
- Cas cliniques

onclepaul .fr