PATIENT TRANSPLANTE HEPATIQUE: ce que le radiologue doit savoir

Agnès RODE
Service d'Imagerie Médicale
Hôpital Croix Rousse LYON

SFR Rhône Alpes 15 Décembre 2007

Région Rhône-Alpes:

- 2006: 147 transplantations hépatiques
(dont 104 à Lyon)
- ces 10 dernières années: 1328 greffes

Anastomose cavo-sus- hépatique

Implantation
« piggy back »
du greffon

Anastomose cavo-sus-hépatique

Anastomose portale

Les sténoses anastomotiques et thromboses sont rares.
A rechercher si ascite inexpiquée ou réapparition de
signes d'HTP.

Pas de gradient de pression
significatif

Anastomose artérielle hépatique

Implantation artérielle:
sur l'a. hépatique propre
à l'origine de l'a. gastroduod.

Variantes anatomiques chez le donneur

Reconstruction artérielle
selon Gordon

PHILIPS

L

15/11/2007

12:13:26

ITm0.1 IM 0.4

6562223

C9-4/ABDO

CI 28Hz

C3

Diagnostic différentiel =

pseudo-anevrisme

anastomotique

mycotique ou non

- Rare
- Parfois découverte fortuite ou en urgence:
tableau de rupture intrapéritonéale ,
fissuration dans les voies biliaires
(mélaenas)

Découverte fortuite
sur écho-doppler de contrôle
à 1 an de la greffe

Pseudoanevrisme anastomotique sacciforme (7 ans post-greffe)

Pontage aorto-hépatique

Pontage aorto-hépatique

Persistance des stigmates de l'HTP:

shunts de dérivation

splénomégalie

LE DOPPLER DU GREFFON

ARTERE HEPATIQUE

VEINE PORTE

V SUS HEPATIQUE

ETUDE des VOIES BILIAIRES

LE DOPPLER DU GREFFON

Analyse artérielle intra-parenchymateuse

LE DOPPLER DU GREFFON

Doppler normal

Doppler pathologique

$$IR = \frac{V_{\text{syst max}} - V_{\text{telediast}}}{V_{\text{syst max}}}$$

LE DOPPLER DU GREFFON

SPECTRE PATHOLOGIQUE
IR < 0.50 et/ou SAT > 0,08 s

Dodd Radiology 94

Doppler
pathologique

$$IR = \frac{V_{\text{syst max}} - V_{\text{telediast}}}{V_{\text{syst max}}}$$

13 ANS après la greffe

Sténose de l'artère hépatique:

le bilan hépatique et la PBF ne se modifient que lorsque la thrombose apparaît.

Doppler pathologique → scanner et/ou artériographie

OU

Patient asymptomatique, VBIH normales, bilan hépatique normal.

3

Nécrose ischémique des VBIH, bilan hépatique pathologique

Asymétrie doppler foie droit/ foie gauche

Takayuki Tohma Radiology 2005 237: 361-365

Angioplastie

Reprise chirurgicale

Sténose complexe

Thromboses de l'artère hépatique

(2.5 à 9%) :

complications BILIAIRES

=

cholangite ischémique

(30 % mortalité)

PRECOCES

TARDIVES

- sepsis répétés
- perte du greffon
- retransplantation

FACTEURS FAVORISANTS de la thrombose de l'artère hépatique

- Difficultés techniques (enfant, donneur vivant..),
- Anastomose artérielle (pontage, variante anatomique, athérome...)
- Épisodes de rejets sévères
- Infection à CMV
- Récurrence du virus C
- Tabagisme post-greffe
-

Leonardi, Transpl Proc 2004

Stange, Liver Transpl 2003

PRECOCE

TARDIVE

Thrombose de l'artère hépatique 5 ans auparavant

Nécrose ischémique des voies biliaires à l'échographie :

COMPLICATIONS BILIAIRES

plus fréquentes que chez non-transplantés (atteinte ischémique de la muqueuse biliaire)

échographie, bili-IRM :
longueur de la sténose? calculs?

Sténoses biliaires:

- **anastomotique**: ischémie du choledoque du donneur lors du prélèvement, fibrose post-opératoire, incongruence des 2 choledoques
(+ fréquente si anastomose bilio-digestive)
- **non-anastomotique**: ischémie artérielle, rejet chronique, infection à CMV...

Sténose anastomotique

Sténose implantation
canal hépatique gauche

Après dilatation et calibrage

Greffe avec anastomose bilio-digestive > 10 ans

abcès

NEOPLASMES

- Ancien éthylo-tabagique (poumon, ORL, œsophage..)
- Transplantation pour CHC
- **Patient immunodéprimé** (lymphome...)
- Cancers cutanés (mélanome...)

Association
d'une tuberculose pulmonaire
et
d'un cancer
non à petites cellules